



LANDSPÍTALI
HÁSKOLASJÚKRAHÚS

Mikilvægt: Merkið sýni og beiðni vandlega

Ónæmispróf fyrir gigtar- og sjálfsofnæmissjúklinga

RANNSÓKNARSTOFNUN LSH, Rannsóknastofa í ónæmisfræði

Eiríksgötu, 101 Reykjavík, sími 543 5821/5800, fax 543 4828

Upplýsingar um rannsókn í síma 543 5821, www.landspitali.is

BEIÐANDI	Læknanr.	Læknir
Stofnun	Deild	Stofa
Dags. beiðni	Tökudagur sýnis	Kl.
Komud. sýnis á rannsóknast.	☐ Svar eða afrit sendist til (ef annar en að ofan)	

Forsenda beiðni og undangengnar rannsóknir

Persónuatriði sjúklings

Rannsóknarnr.

Nafn

Kennitala

Heimili

GREIÐANDI Ef þessi reitur er ekki útfylltur greiðir beiðandi rannsókn

- ☐ Stofnun
☐ Tryggingastofnun ríkisins
TR greiðir fyrir rannsókn ambúlant sjúklinga sjálfstætt starfandi lækna

- ☐ Ambúlant
☐ Innliggjandi
- ☒ **Bráðarannsókn**

GIGTAR- OG BANDVEFSOFNÆMISPRÓF

	NÍÐURSTÖÐUR	VIÐMIÐ. GILDI	ATHUGASEMDIR
☐ RF Rheumaton (skimpróf)	títer	neg	
RF RAPA (Rose Waaler)	ein	< 1/40	
☐ RF ELISA (skimpróf)	ein	< 4	
RF-IgM	ein	< 25	
RF-IgG	ein	< 25	
RF-IgA	ein	< 25	
☐ Anti CCP (cyclic citrullinated peptide)	ein	< 50	
☐ ANA - kjarnamótefni með undirflokkagreiningu (ANA skimpróf á vefjasneið, ENA/dsDNA gert ef jákvætt ANA)	títer	< 1/40	
☐ ANA - kjarnamótefni án undirflokkagreiningar (ANA skimpróf á vefjasneið, ENA/dsDNA ekki gert)	títer	< 1/40	
☐ ENA - ELISA skimpróf (inniheldur RNP, Sm, SSA, SSB, Scl -70, Centromere, Jo-I auk ds DNA)	ein	< 1,4	
Anti RNP	ein	< 1,4	
Anti Sm	ein	< 1,4	
Anti SSA (Ro)	ein	< 1,4	
Anti SSB (La)	ein	< 1,4	
Anti Scl 70	ein	< 1,4	
Anti Centromere	ein	< 1,4	
Anti Jo-I	ein	< 1,4	
☐ Anti ds DNA (Farr aðferð)	%	< 20	
☐ Anti Cardiolipin	IgM	U/ml	< 15
Anti Cardiolipin	IgG	U/ml	< 15
☐ ANCA	PR3 (C-ANCA)	ein	neg
ANCA	MPO (P-ANCA)	ein	neg
☐ Anti GBM	ein	neg	

ÖNNUR SJÁLFSOFNÆMISMÓTEFNI

☐ Thyroglobulin (Hashimoto's eða Grave's sjúkdómur)	IU/ml	< 344	
☐ Thyroid peroxidasi (TPO) (Hashimoto's eða Grave's sjúkdómur)	IU/ml	< 100	
☐ TSH receptor (TRAb, TSI) (Grave's sjúkdómur)		neg	
☐ Sléttir vöðvar (SMA) (Chronic active hepatitis)	títer	< 1/80	
☐ Mitochondria (AMA) (Primary biliary chirostis)	títer	< 1/40	
☐ Parietal frumur (GPC) (Pernicious anemia)		neg	
☐ Intrinsic faktor (IFA) (Pernicious anemia)	ein	< 1,0	
☐ Munnvatnskirtlar (Sjögren's syndrome)	títer	neg	
☐ Nýrnahettubörkur (Addisons sjúkdómur)	títer	neg	
☐ Briskirtilseyjar (ICA) (Sykursýki)	títer	neg	
☐ Þverrákóttir vöðvar (Myasthenia gravis)	títer	< 1/50	
☐ Acetylcholine receptor (Myasthenia gravis)			

KOMPLIMENTPRÓF

☐ Heildarvirkni klassíska ferilsins (CH50)	%	60–124	
☐ Heildarvirkni styttri ferilsins (AP)	%	75–125	
☐ Mannan binding lectin (MBL)	µg/l		
☐ C3	g/l	0,74–1,38	
☐ C4	g/l	0,14–0,37	
☐ Faktor B	%	75–125	
☐ C1 esterase inhibitor	g/l	0,17–0,41	
☐ C3d EDTA-PLASMA	ein	0–50	

- ☐ Cryoglobulin ATH. SÉRSTAKA SÝNAMEDHÖNDLUN
- ☐ CYCLOSPORIN EDTA-blóð
- ☐ Annað, hvað?

5 690939 120815

